



**DOZ. DR. MED. MICHAEL FRÖHLICH · DR. MED. ELLEN JOHN
PROF. DR. MED. DR. MED. DENT. MATTHIAS SCHNEIDER**

MUND-KIEFER-GESICHTSCHIRURGIE
PLASTISCHE OPERATIONEN · IMPLANTOLOGIE
BELEGÄRZTE AM STÄDTISCHEN KLINIKUM DRESDEN-NEUSTADT



VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND VORSCHLÄGE
ZUM VERHALTEN VOR OPERATIONEN
IM MUND-KIEFER-GESICHTS-HALSBEREICH

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

- Bitte informieren Sie uns bei auftretenden Erkältungen, Fieberschüben, Haut- und Mundschleimhautentzündungen, um eine Terminverschiebung bei geplanten Operationen vorzunehmen.
- Nehmen Sie eine Woche vor und nach der Operation kein Schmerzmedikament, in dem Azetylsalizylsäure (z.B. Aspirin, ASS etc.) enthalten ist – Nachblutungsgefahr!
- Waschen Sie Ihre Haare am Abend vor der Operation gründlich und verwenden Sie danach bitte keinen Haarfestiger/-spray u.a. Männer müssen sich am Operationstag gründlich rasieren, Frauen alle Kosmetika (Lider, Augenbraue, Make up) entfernen.
- Lassen Sie Schmuckgegenstände (Ringe, Ohrringe, Ketten usw.) bitte zu Hause!
- Da Sie nach der Operation (insbesondere nach einer Behandlung unter Narkose) kein Kraftfahrzeug fahren können, organisieren Sie bitte mit unserer Hilfe Ihre Heimfahrt!

bitte wenden ►

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS VERHALTEN NACH OPERATIONEN IM MUND-KIEFER-GESICHTS-HALSBEREICH

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

- Der nach Zahntfernung u. ä. Operationen eingelegte Aufbisstupfer sollte nach ca. 1,5 Stunden entfernt werden!
- Schwellungen und Schmerzen treten nach operativen Eingriffen häufig auf, sie können durch kalte Umschläge (Eisbeutel/-akku) auf die entsprechende Gesichtsregion verhindert bzw. gelindert werden.
- Bei Nachblutungen bitte zusammengerollte Taschentücher auf die Wunde legen und erneut ca. 1 Stunde aufbeißen (Druckverband)!
- Bei extremen Schwellungen, Schmerzen, Nachblutungen und auftretendem Fieber ist eine erneute telefonische Rücksprache bzw. Vorstellung in der Praxis erforderlich!
- Bis zur Nahtentfernung (in der Regel am 7. Tag nach der Operation) ist die Wundregion keiner mechanischen Belastung auszusetzen. Deshalb ist eine suppig-breiiige Kost angeraten. Das Rauchen (Druckschwankungen!) und der übermäßige Genuss von Alkohol, Kaffee und Tee sind ebenso wie körperlich belastende Tätigkeiten zu unterlassen.
- Nur in einer sauberen Mundhöhle ist eine komplikationslose Wundheilung gewährleistet; deshalb bitte nach jeder Nahrungsaufnahme den Mund spülen und ab 2. Tag nach der Operation die Zähne putzen.